Vass8R03s176-180

Wtp305

Vass8R03s176-180

Collection Vassal-Montpellier

dagaalaataahaanahaataah

Dika II 8 R3 s-176.180





ANNEEL: 1985

NOM Dako II (m)

ouche Whre Débourre
yeux début mi

EMPLACEPTINT. 8 R 3 x 176, 180

ouche	Wbre yeux		rrement mi/déb			to detail to the same of the s				raison mi/v	fin	Haturité	
	2	6.3	133.	0									
3 fr 4 fr 5 fr) le	13.3.	35 (-4)		Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M- Pour: Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Wigueur: 15							

MOM Dika I

EMPLACEMENT & R 3 & 176. 180

(.01		PRICE JA						_			75		
iche	Nbre	Débou	rrement mi/deb	Thre	Ferti-	Flo: début	raison mi/f		Véraison début mi/v fin			maturité.	
1 2	7	F	28,2	0									
×	f				Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim:								
<i>/</i> >	De	28.2	.96(_17)		Couleur: N-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Púpins: avec - apyrène								
			×		Port :			<u>v</u>	igueur	: -n			

N° d'ordre :

Juntanlanda

Dika I

Désignation :

8 R3n- 176.1804.2

dantadadadadantadantad

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 200 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 94

N° d'ordre :

Juntanlanda

Désignation :

Dika II 8 R30-176,180 A.Z

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dyctodoolooloolootoolootool

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250,

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calro 94

Dika II 8 R30-176.180 s.2

duotodootaaliintiinliintiinl

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Juntanlanta

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande (43).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen [71] - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 94

dentanlantanlantanlantanl

Juntaniant

Observateur Code clone Code cepage Emplacement 8 R3 5176-180 Nom cepage Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 3 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement) - moitié 5 - plus de la moitié 7 Div 208* forme: cylindrique I - conique ou pyramidale 2 oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. Baie oly 220 longueur tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiy 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-20mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur non uniforme 1 - uniforme 8. oiv <u>223</u> forme aplatic 1 - arrondic 2 - elliptique (3) - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. ojy <u>225</u> couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 🗇 niv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 🔎 oiv 227 **pruine** ; nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne **3 -** forte <u>7</u> - très forte 9. oiy 228 **épaisseur pellicule** : t**rès m**ince 1 - mince **3** - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. orv 229 **ombilic** : peu apparent **①**- apparent 2 ory 230* coloration de la pulpe : non coloree 4 - coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe non colorée n- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 rorte coloration 7 - très forte coloration 9. 101v 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 🗗 - élevée 7 - très élevee 9. biv 236 saveur : aucune Ŋ- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5. oiy 236* saveur: aucune (1) - goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) T - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (~16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 7 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. ojy 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3).

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré D- coloré 80.

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9.

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 2 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 4

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes [] - présentes 2

orv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pepins secs) très faible (~10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

---Juntanlante

Code clone

Observateur TD

Code cepage ...

Nom cepage

Emplacement: 8 R3 s 176 180

digitim lantard artandantard

Sarment

oiv 101 section transversale circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5. oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 8

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 💋 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 10+lenticelles absentes P - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1 - présence 9 oiv 100 densité des poils dressés des entrenoeuds absence () présence ()

orv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) Decourts (90mm) 3 moyens (120mm) 5 5,50 longs (150mm) 7 - três longs (>180mm) 9 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) @ moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Vig 25

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9. oiv 55? formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - ele & 7 - très élevé 9. orv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noends aplatis I movens (2) - saillants 3